

# Juniperus oxycedrus L.

Ginebre, càdec

## DESCRIPCIÓ

L'escorça és marró-grisenca i es desprén en tires longitudinals. Igual que els seus congèneres, tota la planta conté olis essencials i és aromàtica. Les fulles són aciculars (en forma d'agulla), de 12-20 cm de llarg per 1,2-2 mm d'ample, punxants i amb dues bandes blanques al feix, que la diferencien de l'altra espècie de ginebre (*J. communis* L.). Es disposen de tres en tres, a manera d'estrela de tres puntes, com les aspes d'un ventilador. Hi ha exemplars mascle i exemplars femella. Els primers formen cons molt xicotets que produeixen el pol·len i els segons uns fruits (en realitat falsos fruits) carnosos i globosos anomenats gàbuls, que mesuren 0,8-1,2 cm de diàmetre, tenen una capa que sembla polsim o cera anomenada pruïna, i són verdosos quan són immadurs i finalment castany-rogens.

## ECOLOGIA

És una planta comuna en els ecosistemes mediterranis, molt associada a l'alzina com a espècie acompanyant o de substitució en alzinars degradats. Creix en terrenys secs i pedregosos, des del nivell de la mar fins als 1000 m i tolera molt bé la sequera.

## DISTRIBUCIÓ

L'espècie habita a la regió mediterrània, mentre que la subsp. *badia* ho fa al nord d'Àfrica i en la Península Ibèrica. En el nostre territori se circumscriu a les regions interiors d'Espanya, i nord-est i centre de Portugal.

## MÉS INFORMACIÓ

- <http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-oxycedrus/>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus\\_oxycedrus](https://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus_oxycedrus)



## CURIOSITATS

**Es feia servir per tractar la sarna dels animals domèstics, així com cicatritzant de les ferides produïdes durant la tosa.**

# Juniperus oxycedrus L.

Enebro, oxicedro, enebro de la miera

## DESCRIPCIÓN

La corteza es pardo-grisácea y se desprende en tiras longitudinales. Al igual que sus congéneres, toda la planta contiene aceites esenciales y es aromática. Las hojas son aciculares (en forma de aguja), de 12-20 cm de largo por 1,2-2 mm de ancho, punzantes y con dos bandas blancas en el haz, que la diferencian de la otra especie de enebro (*J. communis* L.). Se disponen de tres en tres, a modo de estrella de tres puntas, como las aspas de un ventilador. Hay ejemplares macho y ejemplares hembra. Los primeros forman conos muy pequeños que producen el polen y los segundos unos frutos (en realidad falsos frutos) carnosos y globosos llamados gálbulos, que miden 0,8-1,2 cm de diámetro, tienen una capa que parece polvillo o cera denominada pruina, y son verdosos cuando son inmaduros y finalmente castaño-rojizos.

## ECOLOGIA

Es una planta común en los ecosistemas mediterráneos, muy asociada a la encina como especie acompañante o de sustitución en encinares degradados. Crece en terrenos secos y pedregosos, desde el nivel del mar hasta los 1000 m y tolera muy bien la sequía.

## DISTRIBUCIÓN

La especie habita en la región mediterránea, mientras que la subsp. *badia* lo hace en el norte de África y en la Península Ibérica. En nuestro territorio se circunscribe a las regiones interiores de España, y noreste y centro de Portugal.

## MÁS INFORMACIÓN

- <http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-oxycedrus/>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus\\_oxycedrus](https://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus_oxycedrus)



## CURIOSIDADES

Se empleaba para tratar la sarna de los animales domésticos, así como cicatrizante de las heridas producidas durante el esquila.